

SAFETY DATA SHEETS

This SDS packet was issued with item:

070604579

The safety data sheets (SDS) in this packet apply to the individual products listed below. Please refer to invoice for specific item number(s).

070451963 070495713 070503524 070609792 070700294 070850933 071497890 071497924 071497932 071896489

071896505 071896513 071896521 071896539 071896547 071896919 071896927

In accordance with Hazard Communication Standard (HCS),
29CFR 1910.1200(g), 2012 revision

FluoroDose® Lack mit 5% Natriumfluorid
Nur zur zahnärztlichen Verwendung
Gebrauchsanweisungen

Verarbeitungsanleitung:

1. Zähne reinigen und überschüssige Feuchtigkeit aus dem zu behandelnden Bereich entfernen.
2. Folieabdeckung entfernen und langsam nach hinten ziehen, so dass der Applikator-Pinsel und das Behältnis mit dem Lack frei liegen.
3. Applikator-Pinsel entfernen und Material im Behältnis umrühren.
4. Einen dünnen Film Lack auf den Behandlungsbereich auftragen.
5. Den Lack etwa 10 Sekunden lang trocknen lassen und den Patienten anweisen, den Mund zu schließen.
6. Packung und Applikator nach Gebrauch entsorgen.
7. Der Patient kann nach der Behandlung direkt gehen. Ihm sollte geraten werden, nach der Behandlung zwei Stunden lang nur weiche Nahrung und kalte Getränke zu sich zu nehmen und sich mindestens 4 bis 6 Stunden lang die Zähne nicht zu putzen.
8. Nach dem Trocknen kann der Lack unter Umständen „fleckig“ aussehen und sich von der Zahnoberfläche lösen. Die Wirksamkeit des Produkts wird dadurch nicht beeinträchtigt, da sich nach wie vor eine komplette Lackschicht auf dem Zahn befindet.

1. Ulzerative Gingivitis und Stomatitis
2. Bekannte allergische Reaktionen auf Fluorid
3. Verschlucken beim Auftragen vermeiden
4. Bekannte Allergien gegen Kolophonium oder ähnliche Materialien

Nicht verwenden, wenn andere Fluoridbehandlungen (Gele oder Schäume) am selben Tag erfolgen sollen. Nach der ersten Behandlung sollte die Verwendung von Fluoridtabletten und -spülungen unterbrochen werden.

In seltenen Fällen wurde von ödematösen Schwellungen berichtet, insbesondere nach dem Auftragen auf große Flächen. Atemnot ist bei Asthmatikern aufgetreten, wenn auch äußerst selten.

Patienten mit empfindlichem Magen berichteten gelegentlich von Übelkeit. Der Lack lässt sich einfach durch Bürsten und Spülen des Zahns entfernen.

FluoroDose® 5 % natriumfluoridslack
Endast för fackanvändning

Gör så här:

1. Rengör tänderna och ta bort så mycket fukt som möjligt från det område som ska behandlas.
2. Ta tag i folieöverdraget och dra av det långsamt, så att borsten och lackbrunnen kommer fram.
3. Ta bort borsten och blanda materialet i brunnen.
4. Lägg på ett tunt lager lack på det område som ska behandlas.
5. Låt lacken torka i cirka 10 sekunder och se sedan patienten att stänga munnen.
6. Kasta förpackningen och borsten efter användningen.
7. Patienten kan gå hem så snart behandlingen är klar. Rekommendera patienten att endast äta mjuk mat och dricka kalla drycker under två timmar efter behandlingen, och att inte borsta tänderna under minst 4-6 timmar.
8. Överskott av lack som har torkat kan se "fläckigt" ut och kan glida av tanden. Detta kommer inte att påverka produktens verkan eftersom det fortfarande ligger ett helt lager av lack på tanden.

1. Gingivit med sår och stomatit
2. Kända allergiska reaktioner mot fluor
3. Undvik att svälja under penslingen
4. Kända allergier mot kolofonium eller liknande material

Pensla inte om andra fluorbehandlingar (gel eller skum) ska göras samma dag.
Fluortabletter och fluorlösningar ska inte användas på flera dagar efter den inledande behandlingen.

Odematösa svullnader har rapporterats i sällsynta fall, i synnerhet efter pensling av stora ytor. Andnöd är visserligen väldigt sällsynt, men det har drabbat astmapatienter. Patienter med känsliga magar har ibland rapporterat om illamående. Lacken kan lätt tas av med tandborstning och sköljning.

Information Telephone Number: 800-235-5862

sensitization by skin contact.

Name	CAS-No.	Content	Symbol	R-Categories
Rosin	8050-09-7	50-70%		R43 EINECS: 232-475-7
Ethanol	64-17-5	10-30%		[F] R11 EINECS: 200-578-6
Sodium Fluoride	7681-49-4	1-10%	Xi	[T] R25; [-] R32;
			Xi	R36/38 EINECS: 231-667-8

Exact % content withheld due to trade secret restrictions.

Inhalation: No symptoms. Consult a doctor.

Wear protective clothing to prevent contact with skin and eyes.

Methods for Cleaning Up: Take up mechanically, use common absorbents.

Storage conditions: Store in cool, well-ventilated area. Keep container tightly closed.

Other Data: Not available or none.

Hazardous decomposition products: In combustion emits toxic fumes.

NTP Listing: not a known or potential carcinogen

Other adverse effects: Negligible ecotoxicity.

NB: The user's attention is drawn to the possible existence of regional or national regulations regarding disposal.

IATA / ICAO UN no: -

is drawn to the possible existence of additional provisions which complete these

R36/38: Irritating to eyes and skin.

CAUTION: The above information is based on presently available data and to our best knowledge for handling the product under normal conditions. Any use of this product in any way not indicated on this document or using it together with any other process/ procedure will be exclusively under the user's responsibility.



centrix[®]

Making Dentistry Easier.™

CE

0482



centrix dental

CENTRIX INCORPORATED
 770 River Road, Shelton, CT 06484 USA
 (203) 929-5582 (800) 235-5862 FAX (203) 929-6804
www.centrixdental.com



centrix dental

EMERGO AUSTRALIA
 Level 20, Tower II, Darling Park, 201 Sussex Street
 Sydney, NSW 2000, Australia